



MODELO DE BRONCONEUMONÍA

SKU: MF-1132

Categorías: [Modelos Anatómicos](#), [Modelos Anatómicos 3D](#), [Órganos con Patologías](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Historia clínica: No hay historia clínica para este espécimen.

Patología: El espécimen es una sección parasagital del pulmón izquierdo. Hay regiones en parches de consolidaciones focales y decoloraciones causadas por tejido pulmonar congestionado e hiperémico distribuido dentro de ambos lóbulos; sin embargo, el lóbulo superior se ve más gravemente afectado. La consolidación parece concentrarse alrededor de los bronquiolos, que están ectásicos. La superficie costal (pleural) del lóbulo superior está especialmente decolorada.

Más información: La bronconeumonía es una forma de neumonía caracterizada por exudado inflamatorio dentro del espacio intraalveolar que resulta en una consolidación que afecta a un área grande y continua del lóbulo de un pulmón. Es una de las dos clasificaciones anatómicas de

la neumonía (la otra es la neumonía lobular). Las regiones afectadas en este caso muestran hepatización roja focal clásica o consolidación en regiones focales, que se debe a la congestión vascular con extravasación de glóbulos rojos en los espacios alveolares, junto con un mayor número de neutrófilos y fibrina. El llenado de los espacios aéreos por el exudado conduce a una apariencia macroscópica de solidificación o consolidación del parénquima alveolar.

La bronconeumonía es un subtipo de neumonía. Es la inflamación aguda de los bronquios, acompañada de placas inflamadas en los lóbulos peribronquiales y peribronquiolares de los pulmones.

A menudo se contrasta con la neumonía lobular pero en la práctica clínica los tipos son de difícil aplicación, ya que los patrones generalmente se superponen. La bronconeumonía (a veces llamada lobulillar) a menudo conduce a la neumonía lobular a medida que la infección avanza y afecta a todo un lóbulo. El mismo organismo puede causar un tipo de neumonía en un paciente y otro en un paciente diferente. La causa de La bronconeumonía suele ser una neumonía bacteriana en lugar de ser causada por una enfermedad viral y es más comúnmente una neumonía adquirida en el hospital que una neumonía adquirida en la comunidad, en contraste con la neumonía lobular.