



## MOULAGE DE HERIDA ÚLCERA VENOSA DE PIERNA - PEQUEÑA

---

**SKU:** MFS218

**Categorías:** [Cuidado de Heridas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Heridas Simuladas - Moulage](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS219	Fase de Exudación
	MFS220	Fase de Granulación
	MFS221	Fase de Epitelización

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta herida autoadhesiva representa una úlcera venosa de la pierna, un defecto de sustancia en el tejido de la parte inferior de la pierna como resultado de una insuficiencia venosa crónica. Se suministra con caja de almacenamiento. Todos los materiales utilizados en este producto son dermatológicamente inocuos. Para un uso más prolongado, puede fijarse con un pegamento especial para la piel.

Versiones:

- Fase de Exudación.
- Fase de Granulación.
- Fase de Epitelización.

Fase de Exudación:

La fase de exudación que se muestra representa, la fibrina y el exudado excesivo de la herida deben eliminarse durante la limpieza. Esta pequeña herida es perfecta para adherir en el tobillo o en la parte inferior de la pierna y se adhiere por sí sola.

Fase de Granulación:

En esta fase es muy importante utilizar el apósito adecuado para evitar trastornos en la cicatrización de la herida (persistencia de fibrina). Esta pequeña herida es perfecta para adherir en el tobillo o en la parte inferior de la pierna y se adhiere por sí sola.

Fase de Epitelización:

En la etapa de construcción del tejido epitelial, que finalmente conduce al cierre de la herida. Esta pequeña herida es perfecta para adherir en el tobillo o en la parte inferior de la pierna y se adhiere por sí sola.